

DRAGON JAUNE (HLB) & AGRUMES

LA SOLUTION

Barbary Plante Evolution
PAR LE GIE AFRICA AGROBIO



LES ORANGES DE SÉVILLE MENACÉES PAR LA MALADIE DU DRAGON JAUNE

Selon un article paru sur FreshPlaza, les producteurs de la région de Séville doivent prendre des mesures préventives pour protéger leurs 48 000 orangers des bactéries mortelles qui ont déjà dévasté les cultures d'agrumes en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis.

La campagne européenne « Life for Citrus », à laquelle participent l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie, élabore des stratégies visant à enrayer la propagation du Huanglongbing (HLB). Causé par la bactérie *Candidatus liberibacter*, il est propagé par certains insectes et peut détruire complètement un agrume en cinq ans.

L'infestation a déjà atteint des niveaux épidémiques dans 48 pays asiatiques et 53 États africains, ainsi qu'au Brésil et aux États-Unis. Elle a été détectée en Chine en 1943, en Afrique en 1947 et, en 2005, elle avait commencé à dévaster les orangeries de Floride. Il n'est pas encore arrivé en Europe, mais l'insecte vecteur a déjà débarqué.

Agriculture
du Maghreb

AGRIMAG
10/15/2022



IDENTIFIER / CONNAÎTRE / MAÎTRISER



Inscription Connexion


Rechercher



INRAE

Cultures : Identifier, connaître, contrôler / Tropifruit / Fiches maladies et ravageurs / Bactéries / Greening / HLB (Candidatus

Liberibacter)



Greening / HLB (*Candidatus* Liberibacter)

Dernière modification : 12/09/2023
Auteur : M Negri (CIRAD)

Greening, HLB (Huanglongbing)

Candidatus Liberibacter asiaticus, *Ca.* L. africanus et *Ca.* L. americanus



Cultures sensibles : Agrumes

Généralité

Le greening ou HLB est dû à trois espèces de bactéries intracellulaires Gram- du genre *Candidatus* Liberibacter qui colonisent le phloème des plantes. C'est une bactérie non cultivable sur milieux semi-synthétiques, et donc non totalement caractérisable, raison pour laquelle son nom est précédé du terme *Candidatus*.

Elle est largement répandue dans le monde et constitue la menace la plus importante pour les agrumes.

La bactérie est transmise par deux espèces de **psylles** et lors du greffage. Le psylle africain (*Trioza erytreae*) transmet *Ca.* Liberibacter africanus en Afrique, à Maurice et à La Réunion et se rencontre préférentiellement en altitude dans des zones fraîches et humides. En revanche, le psylle asiatique (*Diaphorina citri*) transmet *Ca.* Liberibacter asiaticus dans sa zone d'origine (Asie du sud est) comme dans ses zones d'introduction (Amérique, La Réunion, Maurice), il s'accommode des zones plus chaudes et sèches du littoral. Il ne semble pas exister de préférence vectorielle stricte.

Zones de production affectées :

Guadeloupe	Martinique
Polynésie-française	La Réunion
Madagascar	Comores
Maurice	

Organes affectés :

Feuilles	Fruits
----------	--------

CITRONNIER CONTAMINE PAR LA MALADIE DU DRAGON JAUNE AU PORTO RICO



HUANGLONGBING (HLB) OU DRAGON JAUNE

La Huanglongbing (HLB), également connue sous le nom de maladie du Dragon Jaune, est une maladie bactérienne grave qui affecte les agrumes tels que les orangers, les citronniers, et autres membres de la famille des Rutacées.

Elle est causée par des bactéries du genre *Candidatus Liberibacter*, principalement *Candidatus Liberibacter asiaticus*, *africanus*, et *americanus*.

DEFORMATION DES FRUITS



SYMPTÔMES ET IMPACT

Jaunissement asymétrique des feuilles

Les feuilles présentent un jaunissement partiel ou total qui n'est pas uniforme.

Chutes prématurées des feuilles

Les feuilles affectées tombent prématurément.

Déformation des fruits

Les fruits produits par des arbres infectés sont souvent petits, déformés, et peuvent avoir une maturation irrégulière avec des parties vertes et mûres simultanément.

Goût amer des fruits

Les fruits affectés peuvent avoir un goût amer, les rendant impropres à la consommation.

Mort de l'arbre

Au fil du temps, l'arbre peut décliner et mourir si la maladie n'est pas contrôlée.

INSECTES VECTEURS DE LA CONTAMINATION HUANGLONGBING (HLB) DRAGON JAUNE



MODE DE CONTAMINATION

La contamination par la Huanglongbing (HLB) ou DRAGON JAUNE se fait principalement de deux manières

Par des insectes vecteurs

- Le psylle asiatique des agrumes (*Diaphorina citri*)
- Le psylle africain des agrumes (*Trioza erytreae*)
- Le psylle américain des agrumes (*Candidatus Liberibacter americanus*)

Ces insectes se nourrissent de la sève des plantes en piquant les feuilles et les jeunes pousses, transmettant ainsi les bactéries de plantes infectées à des plantes saines.

Par des greffes de matériel végétal infecté

Utiliser des boutures ou des greffons provenant de plantes infectées peut introduire la maladie dans de nouvelles zones.

PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE



PRÉVENTION ET CONTRÔLE

La gestion de la Huanglongbing repose sur plusieurs stratégies ;

Surveillance et détection précoce

- Inspection régulière des vergers pour détecter les premiers signes de la maladie.
- Utilisation de tests de diagnostic pour confirmer la présence des bactéries.

Gestion des vecteurs

- Contrôle des populations de psylles par l'utilisation d'insecticides.
- Introduction d'ennemis naturels des psylles pour une lutte Biologique.

Matériel végétal sain

- Utilisation de plants certifiés exempts de la maladie.
- Éviter les greffes avec des matériaux potentiellement infectés.

Éradication des Plantes Infectées

- Arrachage et destruction des arbres infectés pour empêcher la propagation de la maladie.

EN RÉSUMÉ

PLANTATION DE CITRONNIERS
CONTAMINÉS PAR LA MALADIE DU
DRAGON JAUNE AU PORTO-RICO



La Huanglongbing (HLB) ou Dragon Jaune est une menace sérieuse pour les plantations d'agrumes à travers le monde et la lutte contre cette maladie nécessite une approche intégrée combinant surveillance, gestion des vecteurs, utilisation de matériel végétal sain, et recherche continue pour **trouver de nouvelles solutions.**

RECHERCHES ET INNOVATIONS

Les **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Evolution**

représentent une innovation majeure pour la régénération des agrumes affectés par la maladie du Dragon Jaune.

Ces fertilisants ont démontré leur efficacité à travers de nombreuses plantations contaminées, permettant aux arbres de retrouver leur cycle de production normal.

RECHERCHES ET INNOVATIONS

Des essais concluants ont été réalisés sur des orangers et des citronniers en Floride, en Californie, au Brésil et à Porto Rico.

Innovation

Une technologie de fertilisants hydro-rétenteurs qui favorise la régénération des arbres malades.

Efficacité

Permet de restaurer le cycle de production des agrumes.

Zones d'essai

Tests réalisés avec succès en Floride, en Californie, au Brésil et à Porto Rico.

RECHERCHES ET INNOVATIONS

Brevet déposé en 1987
après 6 ans de recherche par
le Dr Salah Barbary ingénieur
en technologie minérale

Médaille d'or
au Salon International des
Inventions et des Techniques
Nouvelles de Genève en 1987

Approuvé
par l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle

Fertilisants Hydro-Rétenteurs **Barbary Plante Evolution**

Découvrez comment ils peuvent
transformer la lutte contre la
maladie du Dragon Jaune et
revitaliser vos plantations
d'agrumes.

C'EST QUOI UN FERTILISANTS HYDRO-RÉTENEURS?

Les « **Fertilisants Hydro-Rétenteurs BARBARY PLANTE Évolution** combinent deux concepts : celui de Fertilisant et celui d'Hydro-Réteneur.

Fertilisant

Un fertilisant est une substance ajoutée au sol ou directement aux plantes dans le but de leur fournir les nutriments essentiels à leur croissance et à leur santé.

Les **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Évolution** sont des produits spéciaux qui combinent des engrais conventionnels comme l'Azote (N), le Phosphore (P) et le Potassium (K) sous forme de poudre, avec des oligo-éléments.

Ces nutriments sont encapsulés dans un hydro-réteneur super absorbant biodégradable.

Cela garantit une absorption optimale des éléments nutritifs par les plantes, favorisant ainsi leur croissance et leur protection.

Hydro-réteneur

Un hydro-réteneur est une substance qui a la capacité d'absorber et de retenir l'eau.


Ces substances sont souvent utilisées dans l'agriculture et le jardinage pour aider à retenir l'humidité dans le sol, permettant ainsi aux plantes d'avoir accès à l'eau pendant des périodes plus longues entre les arrosages.

Les **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Évolution** utilisent des copolymères superabsorbants agricoles biodégradables de dernière génération développés spécifiquement par **Barbary Plante** pour permettre l'optimisation de la gestion de l'eau et de la qualité des sols.

COMMENT FONCTIONNE LES FERTILISANTS HYDRO-RÉTENTEURS?

La graine vivante germe et crée des racines afin de rechercher activement de l'eau et des nutriments, attirées **elles s'ancrent dans les gélules Barbary Plante** présents dans le sol.

Durant son processus de croissance, la jeune plante puisera en continu dans les gélules de **Barbary Plante** les nutriments et de l'eau pour nourrir son développement et établir un système racinaire robuste qui maximisera sa croissance.



Le principe d'ancrage des Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Evolution sur les racines d'une plante



Gélules

Fertilisant Hydro-Rétenteur
BARBARY PLANTE G3




QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Les avantages de l'utilisation des **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Evolution** sont multiples

- **Optimisation de l'irrigation**
Leur forte capacité de rétention d'eau dans le sol, permet une utilisation plus efficace des ressources en eau.
- **Amélioration de la santé des plantes**
En fournissant aux plantes un accès plus constant à l'eau et aux nutriments ils favorisent leur croissance et leur développement. Les plantes sont plus saines, plus vigoureuses et moins sensibles au stress hydrique.
- **Réduction des pertes d'engrais**
L'encapsulation des engrais et des oligo-éléments dans l'hydrogel permet de limiter les pertes par lessivage. Les nutriments sont libérés de manière progressive au fur des besoins de la plante, ce qui réduit le gaspillage et maximise l'efficacité des fertilisants.
- **Durabilité environnementale**
Ils répondent aux objectifs d'une agriculture durable et responsable en minimisant l'impact environnemental.

IMMUNISATEUR PREVENTIF & CURATIF



Les
**Fertilisants Hydro-Rétenteurs
Barbary Plante Évolution**
agissent comme un vaccin
et augmente le système
immunitaire des plantes

METHODES

TRAITEMENT CURATIF

L'objectif de cette méthode est de régénérer les arbres fruitiers malades.

Pour ce faire, on utilise les **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Evolution**.

Ceux-ci sont appliqués dans un périmètre élargi à la circonférence du feuillage de l'arbre et à une certaine profondeur, permettant ainsi aux racines de s'y greffer.

Cette approche vise à enrichir le sol autour des arbres fruitiers, facilitant ainsi la régénération des arbres affectés par des maladies.



Régénération de palmiers dattiers au Burkina Faso

METHODES

TRAITEMENT PREVENTIF

L'objectif de cette méthode est de protéger les pousses d'arbres fruitiers dans les pépinières contre les risques de maladie.

Pour ce faire, on utilise des **Fertilisants Hydro-Rétenteurs Barbary Plante Evolution**.

Ceux-ci sont mélangés dans le substrat puis mis en sac ou plateau pour leur culture en pépinière.

Cette approche vise à enrichir le sol autour des germes des futurs arbres fruitiers, facilitant ainsi leur croissance et renforcé leur résistance aux maladies.



TRAITEMENT CURATIF & PREVENTIF AU PORTO RICO



HATCH - 477

"Effets des cultures de couverture et de la gestion de l'agriculture de précision sur le **grand citron vert** (Citrus aurantifolia) cultivé sur des types de sols contrastés"

PI : Dre Rebecca Tirado Corbalá
Co-PI : Jonathan Muñoz Barreto, Dr Elite Valencia-Chin et Dr Elvin Román Paoli

HATCH 477



"HATCH" est un programme de financement de recherche agricole aux États-Unis, connu sous le nom de « Hatch Act ». Ce programme soutient la recherche agricole menée par des stations expérimentales agricoles.

477 : indique le numéro du projet spécifique financé qui se concentre sur les effets des cultures de couverture et de la gestion de l'agriculture de précision sur la culture du grand citron vert, particulièrement sur différents types de sols.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



Identification
des arbres contaminés
par la maladie du
Dragon Jaune
sur la plantation

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



Préparation de la tranchée
tout autour de l'arbre
contaminée par la maladie du
Dragon Jaune.

Le diamètre de cette correspond
à l'envergure du feuillage.

La profondeur est fonction de la
taille de l'arbre entre 10 à 30 cm.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE SUR LE CITRONNIER



Le
**Fertilisant Hydro-Rétenteur
NPK Barbary Plante G3**
est prêt à l'emploi.

Dans cette application, il est
utilisé en moyenne de 10 à 20 kg
par arbre contaminé ou non
contaminé.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE SUR LE CITRONNIER



Le
**Fertilisant Hydro-Réteneur
NPK Barbary Plante G3**
est mis au pied des arbres.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE SUR LE CITRONNIER



La tranchée est refermée afin
de recouvrir le
**Fertilisant Hydro-Réteneur
NPK Barbary Plante G3**
mis au pied des arbres.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE SUR LE CITRONNIER



Les arbres traités sont suivis
afin de d'évaluer et de
valider leur traitement.

TRAITEMENT CURATIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE SUR LE CITRONNIER



Le traitement des citronniers a eu lieu en 2019 sur cette parcelle.

Plusieurs citronniers verts ont été traités pendant cette campagne de traitement curatif de la maladie du Dragon Jaune.

La photo montre un des citronniers traités qui fait des fleurs quelques semaines après le traitement curatif
BARBARY PLANTE

Après quelques mois les résultats ont montré que les citronniers verts traités ont retrouvés une production normale de citrons verts.

TRAITEMENT PREVENTIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



L'équipe scientifique prépare les plateaux
de semences de citronnier vert

Le substrat a été mélangé avec le
**Fertilisant Hydro-Réteneur
NPK Barbary Plante G3**

(visible dans la pelle)
puis réparti dans les plateaux contenant
les semences
(Sac bleu).

TRAITEMENT PREVENTIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



Le plateau présente une partie des semences de citronnier vert **sans** le

**Fertilisant Hydro-rétenteur
NPK BARBARY PLANTE G3**

(à gauche)

et une partie des semences de citronnier vert **avec** le

**Fertilisant Hydro-Rétenteur
NPK Barbary Plante G3**

(à droite).

Ceci démontre l'impact sur la croissance et le développement.

TRAITEMENT PREVENTIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



La différence de taille entre les deux feuilles de ce plateau illustre les bienfaits du **Fertilisant Hydro-Rétenteur NPK Barbary Plante G3** sur la croissance des semences de citronnier vert.

Ce fertilisant, riche en nutriments organiques et en oligo-éléments, renforce la santé des plantes et les immunise contre des maladies telles que le dragon jaune.

TRAITEMENT PREVENTIF DE LA MALADIE DU DRAGON JAUNE DU CITRONNIER



Plusieurs plantations
d'agrumes, notamment
d'orangers et de citronniers, ont
bénéficié de cette technologie
innovante pour réduire l'impact
de la maladie du Dragon Jaune :

En CALIFORNIE

En FLORIDE

Au BRÉSIL

Et

En RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PROTEGER VOS CULTURES



**CONTACTEZ-NOUS
POUR PROTEGER VOS CULTURES
ABORICOLLES**

**PREVENTIF
OU CURATIF**

contact@africa-agrobio.com

www.africa-agrobio.com